

AVERTISSEMENTS AGRICOLES**LORRAINE****GRANDES CULTURES**

Bulletin n° 4 du 17 mars 1994

- Colza**
- Fin de traitement charançon de la tige.
 - Arrivée des méligèthes.
 - Raccourcisseurs uniquement si nécessaire.
- Céréales** - Désherbage antigraminées et antidicotylédones.

Colza*Les colzas sont au stade C1 - C2.***Charançon de la tige**

Le vol s'est généralisé durant la semaine dernière à l'ensemble de la Lorraine et les traitements sont impératifs et très urgents dans les secteurs où ils n'ont pas encore été faits.

Rappelons que les pontes interviennent 10 jours environ après le début du vol et que les colzas sont sensibles aux piqûres de l'insecte jusqu'au stade tige 20 cm.

Méligèthes

L'insecte est signalé dans de nombreuses régions. Le colza est sensible du stade boutons accolés (D1) à l'apparition des premières fleurs (stade E).

Le seuil de traitement est de :

- 1 insecte par inflorescence au stade boutons accolés
- 2 à 3 insectes par inflorescence au stade boutons séparés (E).

Les traitements contre les charançons de la tige sont également efficaces contre les méligèthes (à condition d'avoir traité avec une pyrèthrine).

La surveillance des méligèthes devra se faire dès l'apparition des boutons floraux.

Régulateur de croissance

A partir du stade C2 (entrenœuds visibles), il est possible d'appliquer les régulateurs de croissance (Baronet, Parlay C et Terpal).

Ils doivent être réservés uniquement aux parcelles très exposées à la verse :


- Peuplements trop forts (> à 80 pl/m²)
- Reliquats d'azote excessifs
- Conditions climatiques favorables à une forte croissance (températures et humidités élevées).

Dans de nombreuses situations, cette application s'avère inutile. Rappelons que ces produits exposent davantage les colzas aux attaques de sclérotinia et peuvent augmenter la sensibilité à l'égrenage, du fait que le colza ne s'adosse plus à maturité;

Céréales*Elles sont au stade tallage.*

Il est encore trop tôt pour appliquer les raccourcisseurs de type Cycocel sur blé.

Les mauvaises herbes et notamment de nombreuses dicotylédones sortent et les désherbages antigraminées et antidicotylédones sont à exécuter dès que les conditions extérieures et de terrain le permettent.



7 386

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



ABONNEMENT ANNUEL

310 F